Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.fabryka-rolnika.pl/cezaro-574-sc-0-5-l-p-7414.html



Cezaro 574 SC 0,5 L

Cena brutto	**129,22 zł**
Cena netto	**119,65 zł**
Cena poprzednia	~~**142,00 zł**~~
Kod producenta	**5906647400782**
Kod EAN	**5906647400782**

Opis produktu

CEZARO 574 SC

Cezaro 574 SC to herbicyd selektywny (SC), który zwalcza miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne.

Zawartość substancji czynnych:

flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l(25.83%)

diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) –250 g/l(20.7%)

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 12 g/l (0.99%)

Flufenacet jest substancją o działaniu układowym, zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i część podliścieniową kiełkujących chwastów. Pozostaje w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując go we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Diflufenikan jest substancją o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającą się w roślinie), zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów, barwników biorących udział w procesie fotosyntezy. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Pobierany przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie.

Florasulam blokuje działanie enzymów roślinnych – aminokwasów syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje w konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Pobierany jest przez liścienie i liście chwastów. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach.