Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:08

Link do produktu: https://sklep.fabryka-rolnika.pl/fertile-pasta-na-myszy-i-szczury-150-g-p-7402.html



FERTILE pasta na myszy i szczury 150 g

Cena brutto	**10,92 zł**
Cena netto	**8,88 zł**
Cena poprzednia	~~**12,00 zł**~~
Kod producenta	**5901854365923**
Kod EAN	**5901854365923**

Opis produktu

Substancja aktywna: brodifacum

ZASTOSOWANIE

1. **Wewnątrz budynków** (mysz domowa (Mus musculus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus), szczur śniady (Rattus rattus)):

   Zwalczanie myszy:
   Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
   10-20 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.
   Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
   10-20 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m. Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni.

   Zwalczanie szczurów:
   Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
   10-60 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.
   Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
   10-60 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m. Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM). Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

2. **Wokół budynków** (mysz domowa (Mus musculus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus), szczur śniady (Rattus rattus)):

   Zwalczanie myszy:
   Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
   10-20 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.
   Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
   10-20 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.

   Zwalczanie szczurów:
   Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
   10-60 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.
   Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
   10-60 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna

odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m. Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem, itp.). Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem. Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania myszy przynajmniej co 2-3 dni, szczurów przynajmniej co 5-7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną. Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM). W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.