
Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:08

Link do produktu: https://sklep.fabryka-rolnika.pl/titus-25-wg-100-g-p-7165.html



TITUS 25 WG 100 g

Cena brutto	**96,46 zł**
Cena netto	**89,31 zł**
Cena poprzednia	~~**106,00 zł**~~
Kod producenta	**3576960013666**
Kod EAN	**3576960013666**

Opis produktu

Titus™ 25 WG zwalczy chwasty w Twoich uprawach. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych.

Substancja aktywna jest pobierana bardzo szybko, ponad 50% substancji jest pobierane przez chwasty już w ciągu jednej godziny od zabiegu!

- **Składnik aktywny**
  rimsulfuron 250 g/kg
- **Zalecenia i dawki**

  Kukurydza
  a) Perz właściwy, chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate oraz niektóre chwasty jednoroczne jednoliścienne i dwuliścienne:
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50-60 g/ha
  Titus™ 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml/100 l wody).
  Termin stosowania: w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
  b) Chwasty prosowate i chwasty dwuliścienne występujące w dużym nasileniu.
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Titus™ 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
  Termin stosowania: w fazie 3-4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).
  Ziemniaki
  Zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych.
  a) Zabieg jednorazowy
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
  Titus™ 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.
  b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)
  pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: w fazie 1-7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.
  drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu, gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego.
  Silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi. a) Zabieg jednorazowy
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40-50 g/ha
  Titus™ 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
  b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)
  pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
  Titus™ 25 WG 30 g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
  Termin stosowania: gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Titus™ 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania: po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.

W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus™ 25 WG stosować po wschodach ziemniaka.
pierwszy zabieg tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha.
drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Titus™ 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% Termin stosowania: ziemniaki w fazie 1-7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści. Pomidor
a) Zabieg jednorazowy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha
Titus™ 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
Termin stosowania: po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia, na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)
pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Titus™ 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
Termin stosowania: po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia, na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści. Drugi zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwania: średniokropliste

- **Płodozmian**
  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach agrotechnicznych.
- **Dodatkowe informacje**
  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniakach i pomidorze.