


Link do produktu: <https://sklep.fabryka-rolnika.pl/titus-25-wg-100-g-p-7165.html>

TITUS 25 WG 100 g

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	111,11 zł
Kod producenta	3576960013666
Kod EAN	3576960013666

Opis produktu

Titus™ 25 WG zwalczy chwasty w Twoich uprawach. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych.

Substancja aktywna jest pobierana bardzo szybko, ponad 50% substancji jest pobierane przez chwasty już w ciągu jednej godziny od zabiegu!

- **Składnik aktywny**
rimsulfuron 250 g/kg
- **Zalecenia i dawki**

Kukurydza

a) Perz właściwy, chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate oraz niektóre chwasty jednoroczne jednoliścienne i dwuliścienne:

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50-60 g/ha

Titus™ 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml/100 l wody).

Termin stosowania: w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

b) Chwasty prosowate i chwasty dwuliścienne występujące w dużym nasileniu.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha

Titus™ 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).

Termin stosowania: w fazie 3-4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

Ziemniaki

Zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych.

a) Zabieg jednorazowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha

Titus™ 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania: w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.

b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)

pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha

Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania: w fazie 1-7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.

drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania: po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu, gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego.

Silne zachwaszczenia komosą białą i innymi chwastami dwuliściennymi. a) Zabieg jednorazowy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 40-50 g/ha

Titus™ 25 WG 40-50 g/ha + Sencor 70 WG 0,3 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania: gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 2-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)

pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha

Titus™ 25 WG 30 g/ha + Sencor 70 WG 0,25 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania: gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm, chwasty jednoliścienne są w fazie 1-3 liści; a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha

Titus™ 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania: po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.

W odmianach ziemniaka wrażliwych na Sencor 70 WG środek Titus™ 25 WG stosować po wschodach ziemniaka. pierwszy zabieg tuż przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu plantacji stosować środek Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha.

drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha

Titus™ 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% Termin stosowania: ziemniaki w fazie 1-7 liści, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści. Pomidor

a) Zabieg jednorazowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha

Titus™ 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

Termin stosowania: po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia, na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

b) Zabieg dwukrotny (dawki dzielone)

pierwszy zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha

Titus™ 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

drugi zabieg, maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha

Titus™ 25 WG 20 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Termin stosowania: po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia, na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści. Drugi zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwania: średniokropliste

- **Płodozmian**

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następnie w normalnych terminach agrotechnicznych.

- **Dodatkowe informacje**

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniakach i pomidorze.